

Bronchomed® pastile proti kašlju

Spoštovani.

Z izbiro pastil Bronchomed® ste se odločili za zanesljiv in hitro delujoč izdelek zase in za svojo družino, ki bo v pomoč pri vsakem kašlju ob prehladu, suhem ali mokrem ter z njim povezanim bolečim žrelom.

 Preden vzamete te pastile proti kašlju, natančno preberite celotno navodilo za uporabo.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj so pastile Bronchomed® in za kaj se uporabljajo?
2. Kaj vsebujejo pastile Bronchomed®?
3. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli pastile Bronchomed®?
4. Kako jemati pastile Bronchomed®?
5. Shranjevanje pastil Bronchomed®
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj so pastile Bronchomed® in za kaj se uporabljajo?

Slez in med, ki sta dragoceni glavni sestavini pastil Bronchomed®, delujeta kot balzam, saj prekrijeta in tako pomirita vneto sluznico žrela. Sluz tvori fizično zaščitno plast, ki ščiti pred tujki in tako blaži suh, dražeč kašelj, obenem pa sluznici omogoča, da si opomore.

Pastile Bronchomed® se uporabljajo kot blažilni pripravek za lajšanje dražečih simptomov vnetja v ustni votlini ali žrelu, do katerih prihaja zaradi prehlada, glasovne obremenitve in s tem povezane hripavosti in dražečega žrela ter mokrega in suhega kašlja.

Pastile Bronchomed® zanesljivo in hitro ublažijo vsak kašelj ob prehladu, suh ali moker. Poleg tega izdelek tudi pomiri s tem povezano boleče žrelo.

Pastile Bronchomed® vsebujejo večinoma naravne sestavine in ne vsebujejo alkohola.

Poleg tega ne vsebujejo laktoze, glutena, umetnih barvil, genetsko spremenjenih organizmov ali konzervansov.

Pastile Bronchomed® pomagajo zaščititi ustno sluznico in sluznico žrela v primeru suhosti ali napetih glasilk zaradi glasnega govorjenja ali petja. Pastile Bronchomed® prekrijejo glasilke z zaščitnim slojem in dolgotrajno olajšajo simptome, kot so kašelj, žgečkanje v grlu in odkašljevanje.

Pastile Bronchomed® lahko vzamete podnevi in pred spanjem. Zahvaljujoč njihovem blažilnemu učinku boste lahko mirno in spokojno spali ter si tako hitreje opomogli.

Suh kašelj – dražeč kašelj

Suh ali dražeč kašelj običajno ne vsebuje sluzi, sprožijo pa ga lahko različni dražljaji. Na začetku ali na koncu cikla kašlja, povezanega s prehladom, lahko pride do draženja sluznice zgornjih dihalnih poti. Suh zrak, tujki, kot so prah ali alergeni, ali virusi in bakterije lahko prav tako dražijo sluznico.


Moker kašelj – produktiven kašelj

Telesu lasten sloj sluzi, ki vlaži bronhije in jih ščiti pred izsušitvijo, je sestavljen iz več snovi, denimo mrtvih celic, različnih beljakovin in belih krvnih celic. V primeru boleznih dihal se lahko spremeni sestava ter barva in gostota te sluzi. Če pride do povečane tvorbe sluzi, poskuša telo s pomočjo kašlja iz razvejanega omrežja bronhijev izločiti odvečno sluz. Sluz se s kašljem izloči v ustno votlino, kjer jo lahko bodisi pogoltnete ali pa izpljunete.

Zanesljivo olajšanje kašlja

Refleks kašlja je bistvenega pomena za čiščenje dihalnih poti. Sproži se takrat, ko so prisotni izločki, ki jih je treba izkašljati. Pri tako imenovanem produktivnem kašlju povzroči kašelj nabiranje sluzi. Receptorje za kašelj pa lahko aktivirajo tudi tujki, ki nato sprožijo refleks kašlja ("suh kašelj").

Pastile Bronchomed® blažijo refleks kašlja v fazah suhega in produktivnega kašlja, in sicer tako, da receptorje za kašelj prekrijejo z zaščitnim slojem.



2. Kaj vsebujejo pastile Bronchomed®?

1 pastila Bronchomed® vsebuje:

125 mg suhega izvlečka korenine sleza

125 mg medu

Druge sestavine: arabski gumi, maltitol, citronska kislina, sukraloza, aroma pomaranče, srednjeveržni trigliceridi, prečiščena voda.

3. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli pastile Bronchomed®?

Pastil Bronchomed® ne jemljite, če ste alergični na slez, med ali katero koli drugo sestavino tega medicinskega pripomočka, navedeno v poglavju 2.

V primeru alergijske reakcije prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba pri pacientih s preobčutljivostjo na sladkorje

Bolniki z redko prirojeno preobčutljivostjo za fruktozo ali malabsorpcijo glukoze in galaktoze ne smejo jemati tega izdelka, saj vsebuje med.

Sočasna uporaba pastil Bronchomed® z drugimi zdravili

Če jemljete druga zdravila, vam priporočamo, da jih vzamete od pol do ene ure pred ali po tem, ko ste boste vzeli pastilo Bronchomed®.

Uporaba med nosečnostjo in dojenjem

Med nosečnostjo in dojenjem uporaba pastil Bronchomed® ni priporočljiva.

Uporaba pri otrocih

Pri otrocih, mlajših od 6 let, obstaja nevarnost, da bi pastile pogoltnili, saj še niso razvili nadzorovanega sesalnega vedenja. Uporabe pri otrocih, mlajših od 6 let, ne priporočamo tudi zaradi pomanjkanja podatkov.

Uporaba pri bolnikih s sladkorno boleznijo

1 pastila Bronchomed® vsebuje 0,147 OE (ogljikohidratnih enot).

Neželeni dogodki:

Ni znanih neželenih dogodkov.

Posvetujte se z zdravnikom, če:

Simptomi po petih dneh ne izginejo ali se poslabšajo.

Se pri uporabi pastil Bronchomed® pojavi oteženo dihanje, zvišana telesna temperatura ali gnojen izmeček.

4. Kako jemati pastile Bronchomed®?

Priporočeni odmerek:

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let:

1–2 pastili do 4-krat dnevno (največji dnevni odmerek je 8 pastil)

Otroci, stari od 6 do 11 let:

1 pastila do 4-krat dnevno (največji dnevni odmerek so 4 pastile)

Pastile raztopite v ustih s sesanjem.

5. Shranjevanje pastil Bronchomed®

☞ Tega izdelka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan danega meseca.

🌡️ Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

☀️ Pastile shranjujte v originalni ovojnini, da vsebino zaščitite pred svetlobo.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

O načinu odstranjevanja medicinskih pripomočkov, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Izgled pastil Bronchomed®

Pastile Bronchomed® so rjave in okrogle.

Pakirane so v pretisnem omotu PVC-alu z 10, 20, 30 ali 40 kosi.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Dodatne informacije

Proizvajalec:

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck, Nemčija

Pooblaščen predstavnik:

OPH Oktal Pharma d.o.o.
Pot k sejmišču 26a
1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija

CE 0482

☞ Številka serije je navedena na pretisnem omotu in škatli.

Datum zadnje revizije
oktober 2020

22295-01_SI