



5. Shranjevanje izdelka Bronchomed Junior

Izdelka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na nalepki in škatli. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Po uporabi stekleničko tesno zaprite. Vsebino uporabite v štirih tednih po odprtju stekleničke.

Stekleničko shranjujte v izvorni ovojnini za zaščito pred svetlobo.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Posvetujte se s farmacevtom o tem, kako zavreči medicinske pripomočke, da zaščitite okolje.

6. Vsebina pakiranja in druge informacije

Videz izdelka Bronchomed Junior

Izdelek Bronchomed Junior je rjava tekočina. Njegove naravne sestavine lahko povzročijo nastanek drobnih delcev ter spremembo barve od svetlo do temno rjave. Omenjene spremembe nikakor ne vplivajo na kakovost sirupa.

Polnjen je v rjave stekleničke s prostornino 120 ml, 200 ml in 240 ml, zatesnjene z izvorno navojno zaporko. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja. Priložena merica z lestvico od 2,5 ml do 20 ml omogoča natančno odmerjanje priporočene količine.

Dodatne informacije

Bronchomed Junior Sirup proti kašlju:

Proizvajalec:

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck, Nemčija

Proizvodnja:
Kwizda Pharma GmbH,
Effingergasse 21,
1160 Dunaj, Avstrija

Pooblaščen predstavnik v Sloveniji:

OPH Oktal Pharma d.o.o.
Pot k sejmišču 26a,
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija

Številka serije je navedena na nalepki in škatli.

Bronchomed Junior je blagovna znamka družbe Kwizda Pharma

Datum zadnje revizije:

maj 2021



0482

Priložena merica:
Kunststoffwerk
Kremsmünster GmbH
Kremseggerstraße 17
4550 Kremsmünster, Avstrija



0483

14287_3_SI
227

NAVODILO ZA UPORABO

Bronchomed Junior 120 ml

Slez in med

Spoštovani.

Z izdelkom Bronchomed Junior ste izbrali zanesljiv in hitro delujoč izdelek zase in za svojo družino, ki bo v pomoč pri vsakem kašlju ob prehladu, suhem ali mokrem.

Preden vzamete ta sirup proti kašlju, natančno preberite celotno navodilo za uporabo.

Navodilo vsebuje

1. Kaj je izdelek Bronchomed Junior in za kaj se uporablja?
2. Kaj vsebuje izdelek Bronchomed Junior?
3. Kaj morate vedeti, preden vzamete izdelek Bronchomed Junior?
4. Kako jemati izdelek Bronchomed Junior?
5. Shranjevanje izdelka Bronchomed Junior.
6. Vsebina pakiranja in druge informacije.

1. Kaj je izdelek Bronchomed Junior in za kaj se uporablja?

Dragoceni glavni sestavini, slez in med, v izdelku Bronchomed Junior delujeta kot balzam, ki pokrije vneto žrelno sluznico in jo s tem pomirja. Sluz tvori fizično zaščitno prevleko proti tujkom, s čimer blaži suh, dražeč kašelj in omogoča, da si sluznica opomore.

Izdelek Bronchomed Junior zanesljivo in hitro ublaži vsak kašelj ob prehladu, suh ali moker. Poleg tega je izdelek Bronchomed Junior v pomoč pri zaščiti sluznice ust in žrela, kadar je ta suha. Tanka plast izdelka bo pri govoru in petju zaščitila sluznico in ublažila neprijetne simptome, kot so kašelj, žgečkanje in grlu in odkašljevanje.

Izdelek Bronchomed Junior je sirup proti kašlju, ki vsebuje večinoma naravne sestavine in je brez alkohola.

Izdelek se dobro prenaša, zato je primeren za otroke.

Izdelek je primeren za dnevno in nočno uporabo. S svojim blažilnim učinkom pripomore k mirnemu in krepčilnemu spancu.

Suh kašelj – dražeč kašelj

Suh ali dražeč kašelj je običajno brez sluzi, sprožijo pa ga lahko različni dražljaji. Na začetku ali na koncu ciklusa kašlja ob prehladu lahko pride do draženja sluznic zgornjih dihal. Sluznice lahko dražijo tudi suh zrak, tujki, kot so prah ali alergeni, ter virusi in bakterije.

Moker kašelj – produktiven kašelj

Lastni sluzni film telesa, ki ohranja bronhe vlažne in jih varuje pred izsušitvijo, vsebuje več sestavin, npr. mrtve celice, različne beljakovine in bele krvne celice.



Pharmacode 227



Pharmacode 227



Pri boleznih dihal se lahko spremenijo njegova sestava, barva in konsistenca. Če se tvorba sluzi poveča, poskuša telo čezmerno sluz iz razvejanega mrežja bronhov odstraniti s kašljem. Sluz lahko izkašljate v ustno votlino, kjer jo lahko pogoltnete ali izpljunete.


Izdelek Bronchomed Junior pomaga ublažiti draženje tudi pri mokrem kašlju, ko je razdražena žrelna sluznica.

Zanesljivo olajšanje kašlja


Refleks kašlja je bistvenega pomena za čiščenje dihalnih poti. Sproži se, če so prisotni izločki in jih je treba izkašljati. Pri tako imenovanem produktivnem kašlju povzroči kašelj nakopičena sluz. Receptorje za kašelj lahko aktivirajo tudi tujki, s čimer sprožijo refleks kašlja („suh kašelj“).

Izdelek Bronchomed Junior blaži refleks kašlja v fazah suhega in produktivnega/mokrega kašlja tako, da prekrije receptorje za kašelj z zaščitno plastjo.

zaščitna plast korenine
sleza in medu



aktiviran
receptor za kašelj



2. Kaj vsebuje izdelek Bronchomed Junior?

15 ml izdelka Bronchomed Junior vsebuje:

143 mg suhega izvlečka sleza,
750 mg medu.

Druge sestavine: ksilitol, ksantan, brezvodni glicerol, citronska kislina, aroma jagode, metil-4-hidroksibenzoat, propil-4-hidroksibenzoat, prečiščena voda.

Izdelek Bronchomed Junior je brez umetnih barvil, laktoze, glutena, alkohola in brez gensko spremenjenih organizmov.

3. Kaj morate vedeti, preden vzamete izdelek Bronchomed Junior?

Izdelka Bronchomed Junior ne jemljite,

če ste alergični na slez ali med ali katero koli drugo sestavino tega medicinskega

pripomočka, navedeno v poglavju 2. Če pride do alergijske reakcije, izdelek prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

15 ml izdelka Bronchomed Junior vsebuje 2,76 g ksilitola. Kalorična vrednost ksilitola je 2,4 kcal/g. Ksilitol ima lahko odvajalni učinek.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba pri pacientih s preobčutljivostjo za sladkorje

Bolniki z redko prirojeno preobčutljivostjo za fruktozo ali malabsorpcijo glukoze in galaktoze ne smejo jemati tega izdelka, saj vsebuje med.

Uporaba pri bolnikih s sladkorno boleznijo

15 ml izdelka Bronchomed Junior vsebuje 0,3 OE (ogljikohidratnih enot).

Uporaba med nosečnostjo in dojenjem

Uporaba izdelka Bronchomed Junior ni priporočljiva med nosečnostjo in dojenjem.

Uporaba pri otrocih

Otroke, mlajše od 3 let, mora pregledati zdravnik, da izključi resnejše bolezni. Uporaba pri otrocih, mlajših od 1 leta, ni priporočljiva.

Sočasna uporaba izdelka Bronchomed Junior z drugimi zdravili

Če jemljate druga zdravila, se priporoča, da jih vzamete od pol ure do eno uro pred jemanjem izdelka Bronchomed Junior ali po njem.

Posvetujte se z zdravnikom, če:

Simptomi po petih dneh ne izginejo ali se poslabšajo.

Se pri uporabi izdelka Bronchomed Junior pojavijo oteženo dihanje, zvišana telesna temperatura ali gnojen izmeček.

Izdelek Bronchomed Junior vsebuje konzervansa metil-4-hidroksibenzoat in propil-4-hidroksibenzoat, ki lahko povzročita alergijske reakcije (te so lahko zapoznele).

4. Kako jemati izdelek Bronchomed Junior?

Za lažje odmerjanje je priložena merica.

Otroci, stari od 6 do 11 let: 15 ml do štirikrat na dan.

Otroci, stari od 4 do 5 let: 7,5 ml do štirikrat na dan.

Otroci, stari od 2 do 3 leta: 5 ml do štirikrat na dan.

Otroci, stari eno leto ali več: 5 ml do trikrat na dan.

Izdelek Bronchomed Junior se lahko jemlje podnevi in ponoči.

Za najboljše rezultate je izdelek Bronchomed Junior priporočljivo jemati tako pogosto, kot je priporočeno.

Če ste v dvomih ali/in imate kakršno koli vprašanje ali pomislek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.



Pharmacode 227

